

RECOMENDACIONES POR
COVID-19 PARA EL SECTOR
LÁCTEO



**Consorcio
Lechero**

Desinfección instalaciones y áreas de
trabajo

#LALECHENOPARA

www.consorciolechero.cl



Frente a un caso Covid-19 confirmado

Si no dispongo de una empresa externa ¿Cómo desinfectar?

Para evitar el riesgo de contagio del resto del personal es necesario LIMPIAR y DESINFECTAR las áreas contaminadas. El personal debe realizar la higiene y desinfección siguiendo las recomendaciones de la autoridad sanitaria:

- Realizar la limpieza y desinfección de todas las áreas y superficies que tuvieron contacto con la persona positiva a Covid-19.
- Utilizar elementos de protección personal: **Respirador N95, Guantes Quirúrgicos, Traje desechable, Antiparras y/o protector facial.**
- Limpiar la superficie eliminando materia orgánica con algún detergente con toalla desechable o paño.
- Si desinfecta con cloro doméstico (concentración 5%) por cada litro de agua se debe agregar 20 cc de Cloro (4 cucharaditas). Si la superficie se daña con cloro puede usar Alcohol 62%-70% o peróxido de hidrógeno al 0,5%.

#LALACHENOPARA



Podrá encontrar información más detallada en “Protocolo de limpieza y desinfección de ambientes - Covid-19” del MINSAL.

- Aplicar el desinfectante sobre toda la superficie con rociador y dejar actuar hasta que se seque.
- Los papeles desechables usados deben ser dispuestos en un contenedor con doble bolsa plástica resistente, y entregados al servicio de recolección de residuos municipal para evitar roturas.
- Los elementos de protección desechables deben ser quitados de manera correcta y eliminados bajo la recomendación anterior.
- Si fue necesario el uso de paños de tela o mopas, estos deben ser dejados en agua con cloro en la dilución recomendada.
- Posteriormente lavar sus manos con agua y jabón durante 30 segundos al menos.
- En el caso de utilizar EPP reutilizables, estos deben lavarse y desinfectarse utilizando los productos señalados anteriormente.

#LALECHENOPARA