


# CALENDARIO DEL PASTOREO

# 2014



Consorcio Lechero  
LA CADENA LÁCTEA DE CHILE



# INVIERNO



8 - 12 cms.



Rotación

40 - 60 días



1.800 - 2.000 kg MS/ha



PLANTA con 2,5 hojas

## CRITERIOS DE ENTRADA



1.000 - 1.200 kg MS/ha



4 - 5 cms.

## CRITERIOS DE SALIDA

**Recuerda que...!!**

La tasa de crecimiento y consecuentemente la cobertura estarán limitadas por bajas temperaturas.

El sobre pastoreo agota las reservas de las plantas y produce un lento rebrote, en consecuencia genera un retraso en el crecimiento de primavera. Por lo tanto suplemente para proteger sus praderas!!!

Evitar pastorear con el suelo saturado de agua, con heladas o bajar la carga animal para disminuir daño por pisoteo.

En base al análisis de suelo y con temperaturas de al menos 10°C (fines de agosto a principios de septiembre) Fertilice sus praderas!!

No suministrar ensilaje directamente en el potrero para evitar daño en la pradera (pisoteo, sombra y acidez del material) y pérdida de ensilaje. Prefiera la utilización de potreros de sacrificio o plataforma de alimentación.

# 2014

## JUNIO

L	M	M	J	V	S	D
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29

## JULIO

L	M	M	J	V	S	D
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			

## AGOSTO

L	M	M	J	V	S	D
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31



# OTOÑO



## CRITERIOS DE ENTRADA



## CRITERIOS DE SALIDA

**Recuerda que...!!**

La tasa de crecimiento de la pradera aumenta desde mediados de marzo al 15 de mayo.

Pastoreos muy tardíos producen una baja eficiencia de utilización y menor calidad nutritiva por acumulación de hojas muertas.

Época con buena respuesta a la fertilización, hágalo tempranamente y así estimulará crecimiento y macollaje. Parcialice el nitrógeno.

Establezca sus praderas y cultivos suplementarios no más allá del 10 de marzo.

## 2014

### MARZO

L	M	M	J	V	S	D
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24 31	25	26	27	28	29	30

### ABRIL

L	M	M	J	V	S	D
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30				

### MAYO

L	M	M	J	V	S	D
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	





# PRIMAVERA



15 - 20 cms.

Rotación

14 - 25 días



2.200 - 2.600 kg MS/ha

Hoja 2 Hoja 3  
Hoja 1

PLANTA con 2,5 hojas



1.400 - 1.600 kg MS/ha



4 - 7 cms.

## CRITERIOS DE ENTRADA

## CRITERIOS DE SALIDA

**Recuerda que...!!**

Si establece praderas permanentes, hágalo antes del 15 de septiembre y evite rezagarlas en su primer año.

La pradera puede presentar baja fibra efectiva, suplemente!!! para favorecer rumia, evitar desarrollo de acidosis y mayor contenido de grasa en leche.

Pastoreos tardíos producen una baja eficiencia de utilización y menor valor nutritivo por encañado y muerte de hojas.

Evalúe el establecimiento de cultivos suplementarios para la utilización estival o invernal.

Época de mayor tasa de crecimiento donde se obtienen las mayores coberturas de pradera.

Potreros que superen los criterios de entrada para pastoreo, destínelos a cosecha de ensilaje.

Época con mayor respuesta a la fertilización, hágalo tempranamente y así estimulará crecimiento y macollaje. Parcialice el nitrógeno.

Pastoreos con descansos muy cortos y que no cumplan con los criterios de entrada tienen menor rendimiento y niveles excesivos de proteína.

# 2014

### SEPTIEMBRE

L	M	M	J	V	S	D
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30					

### OCTUBRE

L	M	M	J	V	S	D
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

### NOVIEMBRE

L	M	M	J	V	S	D
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30						

### DICIEMBRE

L	M	M	J	V	S	D
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				





# VERANO



10 - 15 cms.



Rotación  
20 - 35 días



2.000 - 2.400 kg MS/ha



PLANTA con 2,5 hojas

## CRITERIOS DE ENTRADA



1.600 - 1.800 kg MS/ha



4 - 6 cms.

## CRITERIOS DE SALIDA



Dejar residuos muy altos post-pastoreo se traduce en una baja eficiencia de utilización de la pradera y una disminución de la calidad nutritiva del siguiente pastoreo.

Fines de febrero y comienzo de marzo, fecha ideal para regeneraciones, establecimientos y enmiendas.

Cortes de limpieza: Si algunos potreros se encañan, es aconsejable hacer un corte de limpieza (15 cm de altura), para eliminar el forraje sobremaduro y espigas.

La tasa de crecimiento está limitada por el déficit hídrico. Posibilidad de suplementar con cultivos forrajeros.

Potreros que excedan los criterios de entrada para pastorear, destínelos a producción de ensilaje o heno.

Pastoreos tardíos producen una baja eficiencia de utilización por encañado y muerte de hojas.

Dar ensilaje directamente en la pradera o siempre en el mismo lugar, daña por sombreo y acidez del material.

## 2014

### DICIEMBRE

L	M	M	J	V	S	D
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

### ENERO

L	M	M	J	V	S	D
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		

### FEBRERO

L	M	M	J	V	S	D
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28		

